



Medikamente

Falls Sie regelmäßig Medikamente einnehmen,
berücksichtigen Sie bitte folgendes:

- Wenn Sie aufgrund einer Ihrer Vorerkrankungen »blutverdünnende« Medikamente wie z.B. Acetylsalicylsäure / ASS (z. B.: Aspirin[®], Aggrenox[®]), Clopidogrel (z. B.: Plavix[®], Iscover[®]), Ticagrelor (Brillique[®]), Prasugrel (Efient[®]) einnehmen, werden diese Medikamente in aller Regel vor der Koloskopie nicht abgesetzt. Sie sollten diese Medikamente nur dann absetzen, wenn es im Rahmen der Aufklärung ausdrücklich besprochen worden ist.
- Falls Sie zwei der oben genannten Präparate einnehmen, wird eins in der Regel pausiert. Dies wird aber im Rahmen der Aufklärung ausdrücklich besprochen.
- Die Einnahme von Marcumar oder anderen blutverdünnenden Substanzen wie Pradaxa[®], Xarelto[®], Eliquis[®] oder Lixiana[®] muss dagegen normalerweise unterbrochen werden. Die überbrückende Therapie mit fraktioniertem Heparin (Fraxiparin[®], Clexane[®], Monoembolox[®], Arixtra[®] oder mit anderen Präparaten bzw. »Bauchspritzen«) wird im Rahmen des Vorgesprächs genau festgelegt.
- Diabetiker, die blutzuckersenkende Medikamente einnehmen, sollten diese Medikamente während der Darmspülung/ Nüchternphase nicht oder nur reduziert anwenden. Die Einnahme wird im Rahmen des Vorgesprächs ebenfalls besprochen.

Ihre übrigen Tabletten nehmen Sie bitte auch am Tag der Untersuchung wie gewohnt ein.