



### Information für Patienten

#### **Umstellung einer blutverdünnenden Therapie mit Marcumar vor einer endoskopischen Untersuchung (Magenspiegelung / Darmspiegelung)**

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine endoskopische Untersuchung des Verdauungstraktes vorgesehen. Zur Verringerung des Blutungsrisikos muss die derzeitige **blutverdünnende Therapie mit Marcumar** umgestellt werden. Das Vorgehen wurde Ihnen bereits im Aufklärungsgespräch erläutert. Die Umstellung können Sie bei uns oder bei Ihrem Hausarzt nach folgendem Schema durchführen.

1. Absetzen von Marcumar am: .....
2. Keine überbrückende Therapie notwendig (bitte Punkte 3-5 nicht beachten!) [ ]
3. Beginn der überbrückenden Blutverdünnung („Bauchspritze“) mit Arixtra (alternativ: Fraxiparin/Clexane) am:.....
4. Dosierung von Arixtra: ..... mg einmal täglich morgens (Fraxiparin/Clexane: ..... ml morgens und abends)
5. Bitte am Tag der Spiegelung keine „Bauchspritze“ verabreichen
6. Kontrolle von INR/Quick einen Tag vor der Spiegelung bei uns oder beim Hausarzt (bitte telefonische Übermittlung des Ergebnisses)
7. Wiederaufnahme der überbrückenden Therapie mit Arixtra (Fraxiparin/Clexane) am: .....
8. Wiederaufnahme der Marcumartherapie am: .....
9. Drei Tage nach Wiederaufnahme der Marcumartherapie bitte INR/Quick-Bestimmung beim Hausarzt

Bei Fragen / Unklarheiten bitten wir Sie, uns oder Ihren Hausarzt zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Praxisteam